

<https://helda.helsinki.fi>

Syövän aiheuttama selkäytimen puristustila

Lauren, Hanna

2019

Lauren , H & Tarkkanen , M 2019 , ' Syövän aiheuttama selkäytimen puristustila ' ,
Duodecim , Vuosikerta. 135 , Nro 19 , Sivut 1875 . <
<https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2019/19/duo15175> >

<http://hdl.handle.net/10138/320942>

publishedVersion

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.



Syövän aiheuttama selkäytimen puristustila

Seitsemänkymmentäyksivuotiaalla miehellä oli aiemmin todettu kohonnut verenpaine ja hyperkolesterolemia. Kuukausia jatkuneen selkäkivun vuoksi otettiin lannerangan röntgenkuva, jossa todettiin kasaan painunut rintanikaman (Th XI) nikamansolmu (**KUVA 1**). Ennen kuin jatkotutkimuksia ehdittiin tehdä, potilaalla ilmenivät vannemainen ylävatsakipu ja kuume, minkä vuoksi käynnistettiin erikoissairaanhoidon tutkimukset.

Potilaalle tehtiin vartalon tietokonetomografia, jossa todettiin akuutti sappirakkotulehdus ja luuston lyyttiset, pahanlaatuisen näköiset pesäkkeet. Th XI nikamansolmu oli painunut kasaan, ja sitä ympäröi pahanlaatuisiksi sopiva pehmytkudosmassa, joka ahtausti selkärangan kanavaa ja juuriaukkoja (**KUVA 2**).


Potilas sai kiireellisen sädehoidon steroidituen turvin, eikä halvausta kehittynyt. Jatkotutkimuksissa tauti osoittautui pahanlaatuiseksi myeloomaksi. Vaikeutuva kiputila on tutkittava ripeästi ja syövän mahdollisuus pidettävä mielessä: kun selkäytimen puristustila havaitaan ajoissa, vältetään syövän aiheuttamalta halvaukselta, joka vaikeuttaisi jatkohoitoa merkittävästi. ■

HANNA LAUREN, LL, radiologian erikoislääkäri
HUS Kuvantaminen

MAIJA TARKKANEN, dosentti, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri
HYKS Syöpäkeskus ja Helsingin yliopisto
toimitussihteeri, Aikakauskirja Duodecim



KUVA 1.



KUVA 2.